

Recorte as imagens e separe-as de acordo com a tabela de cada região e clima.

Equatorial

**Açaí**



Beto Junior / Gettyimages

**Bacaba**



Wikimedia Commons

**Bacuri**



Wikimedia Commons

**Pupunha**



Wikimedia commons

**Buriti**



Fernanda Martinho / Gettyimages

**Cupuaçu**



Wikimedia Commons

Tabela de produção de acordo com as condições ideais de desenvolvimento produto.

**Região Equatorial**

Nome	Período de safra
Açaí	A safra do açaí vai de agosto a novembro. Logo após a estação chuvosa. É possível a colheita do açaí durante as chuvas e neblina, porém é muito mais difícil o amadurecimento da fruta.
Bacaba	A safra da bacaba ocorre em período inverso ao açaí, ou seja, vai de dezembro a junho na estação de chuva forte.
Bacuri	A safra vai de janeiro a abril. A colheita do bacuri é indicado no início da estação das chuvas.
Pupunha	A safra da pupunha vai de janeiro a fevereiro, sendo logo após o período de seca.
Buriti	A safra da buriti é igual ao da pupunha vai de janeiro a fevereiro, sendo logo após o período de seca.
Cupuaçu	A safra do cupuaçu é extensa ocorre no período de outubro a junho, sendo melhor na época chuvosa.

## Região Tropical

Maracujá-do-cerrado



Wikimedia commons

Abacaxi-do-cerrado



Luis Beluga / Gettyimages

Pequi



Gettyimages

Macaúba



Wikimedia Commons

Araticum



Wikimedia commons

Pera-do-cerrado



Xavier J. / Gettyimages

Tabela de produção de acordo com as condições ideais de desenvolvimento produto.

**Região Tropical**

Nome	Período de safra
Maracujá-do-cerrado	A safra é prevista para o ano inteiro sob irrigação, com pico de produção na época das chuvas de dezembro a março.
Abacaxi-do-cerrado	A safra vai de novembro e estende até o final de fevereiro, estação das chuvas.
Pequi	A safra vai de dezembro e estende até o final de fevereiro, estação das chuvas.
Macaúba	A safra é prevista para o ano inteiro sob irrigação, com pico de produção na época de clima ameno e início das chuvas mais fortes de outubro a dezembro
Araticum	A safra vai de março a abril, estação mais amena, com chuvas regulares.
Pera-do-cerrado	A safra é outubro a novembro marcado por temperaturas mais amenas e chuvas regulares.

## Região Tropical Semiárido

**Umbu**



**Ciriguela**



Wikimedia commons

**Cajá ou taperebá**



Luis Henrique Mendes / Gettyimages

**Acerola**



Wikimedia commons

**Carambola**



Wikimedia commons

**Caju**



Wikimedia commons

Tabela de produção de acordo com as condições ideais de desenvolvimento produto.

### Região Tropical Semiárido

Observação: a região do sertão nordestino é marcada por fortes secas. A agricultura se tornou possível nos últimos anos devido aos novos sistemas de irrigação.

Nome	Período de safra
Umbu	A safra do umbu vai de janeiro a fevereiro, é produzido em regiões com poucas chuvas.
Ciriguela	A safra da ciriguela vai de dezembro a janeiro, é produzido em regiões com poucas chuvas;
Cajá	A safra do cajá varia de acordo com os estados produtores sendo de janeiro a maio no Ceará. Depende de irrigação.
Acerola	A safra da acerola ocorre o ano todo, sendo que o pico ocorre na primavera e no verão. Depende também de uma boa irrigação.
Carambola	A safra da carambola ocorre em fevereiro, dependendo também da irrigação.
Caju - Região do sertão	A safra do caju varia de acordo com os estados produtores sendo de outubro a janeiro no Ceará. Depende de irrigação.

## Região Tropical de Altitude

**Acerola**



Wikimedia commons

**Banana**



Juan Salamanca / Pexels

**Laranja**



Pixabay

**Uva**



Kay Chie-Chan / Pexels

**Figo**



Wikimedia commons

**Limão**



Images Thai

Tabela de produção de acordo com as condições ideais de desenvolvimento produto.

#### Região Tropical Altitude

Acerola	A safra da acerola ocorre o ano todo, sendo que o pico ocorre na primavera e no verão com chuvas mais intensas.
Banana	A safra da banana pode durar o ano todo, sendo o pico na época das chuvas.
Laranja	A safra da laranja vai de junho a agosto.
Uva	A safra da uva é de janeiro até março.
Figo	A safra do figo é janeiro a fevereiro, entretanto o figo tem também a entressafra entre agosto e outubro.
Limão	A safra do limão é no verão janeiro e fevereiro.

## Região Tropical Litorâneo

**Acerola**



Wikimedia commons

**Caju**



Wikimedia commons

**Ameixa da Mata**



Debora Hanu / Gettyimages

**Coco**



Oleksandr Pdvalny / Pexels

**Banana**



Juan Salamanca / Pexels

**Grumixama**



Ribeiro Antonio / Gettyimages

Tabela de produção de acordo com as condições ideais de desenvolvimento produto.

### Região Tropical Litorâneo

Acerola	A safra da acerola ocorre o ano todo, sendo que o pico ocorre na primavera e no verão com chuvas mais intensas.
Caju - Litoral nordestino	A safra do caju varia de acordo com os estados produtores sendo no litoral do Rio Grande do Norte de novembro a fevereiro. Depende de irrigação.
Ameixa da Mata	A safra da Ameixa da mata ocorre entre dezembro a janeiro.
Coco	A safra do coco é de novembro a fevereiro. Na estação da chuva.
Banana	A safra da banana pode durar o ano todo, sendo o pico na época das chuvas.
Grumixama	A safra da Grumixama ocorre entre dezembro a janeiro.

## Região Subtropical

**Uvaia**



Wikimedia commons

**Banana**



Juan Salamanca / Pexels

**Uva**



Kay Chie-Chan / Pexels

**Pêssego**



Brigette Tohm / Unsplash

**Maracujá**



Wikimedia commons

**Morango**



Pexels

Tabela de produção de acordo com as condições ideais de desenvolvimento produto.

### Região Subtropical

Uvaia	A safra da uvaia vai de setembro a janeiro
Banana	A safra da banana pode durar o ano todo, sendo o pico na época das chuvas.
Uva	A safra da uva é de janeiro até março.
Pêssego	A safra do pêssego vai de outubro até começo de março
Maracujá	A safra do maracujá é entre janeiro e março.
Morango	A safra do morango vai maio até dezembro, sendo o pico de produção nas temperaturas mais amenas de junho a agosto.